



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ  
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

**П Р И К А З**

« 04 » 03. 2022 г.

№ 107

**Об утверждении регионального календаря профилактических прививок и регионального календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям**

В соответствии со статьями 1, 9 и 10 Федерального закона от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 декабря 2021 г. № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить:

1.1. Региональный календарь профилактических прививок (приложение 1 к настоящему приказу).

1.2. Региональный календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям (приложение 2 к настоящему приказу).

1.3. Порядок проведения профилактических прививок (приложение 3 к настоящему приказу).

2. Признать утратившими силу:

- приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 18 ноября 2019 г. № 975 «Об утверждении регионального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»;

- приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 10 ноября 2020 г. № 1278 «О внесении изменений в приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 18 ноября 2019 г. № 975».

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента здравоохранения города Москвы **Старшинина А.В.**

Исполняющий обязанности  
руководителя Департамента  
здравоохранения города Москвы

**А.С. Токарев**



## *Региональный календарь профилактических прививок*

<b>Категории и возраст граждан, подлежащих обязательной вакцинации</b>	<b>Наименование профилактической прививки</b>
Новорожденные в первые 24 часа жизни	Первая вакцинация против вирусного гепатита В*(1)
Новорожденные на 3-7 день жизни	Вакцинация против туберкулеза *(2)
Дети 1 месяц	Вторая вакцинация против вирусного гепатита В *(0)
Дети 2 месяца	Третья вакцинация против вирусного гепатита В (группы риска) *(3)
	Первая вакцинация против пневмококковой инфекции
	Первая вакцинация против ротавирусной инфекции
Дети 3 месяца *(6.1)	Первая вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка
	Первая вакцинация против полиомиелита*(4)
	Первая вакцинация против гемофильной инфекции (группы риска) *(5)
	Вторая вакцинация против ротавирусной инфекции

Дети 4,5 месяцев *(6.1)	Вторая вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка
	Вторая вакцинация против гемофильной инфекции (группы риска) *(5)
	Вторая вакцинация против полиомиелита *(4)
	Вторая вакцинация против пневмококковой инфекции
	Третья вакцинация против ротавирусной инфекции
Дети 6 месяцев *(6.1)	Третья вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка
	Третья вакцинация против вирусного гепатита В *(1)
	Третья вакцинация против полиомиелита *(6)
	Третья вакцинация против гемофильной инфекции (группа риска)* (5)
Дети 12 месяцев	Вакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита
	Четвертая вакцинация против вирусного гепатита В (группы риска) *(3)
	Вакцинация против ветряной оспы перед поступлением в детские дошкольные образовательные организации, детям домов 'ребенка' *(7)
Дети 15 месяцев	Ревакцинация против пневмококковой инфекции
Дети 18 месяцев *(6.1)	Первая ревакцинация против полиомиелита *(6)
	Первая ревакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка
	Ревакцинация против гемофильной инфекции (группы риска)

Дети 20 месяцев	Вторая ревакцинация против полиомиелита *(6)
Дети 3-6 лет	Вакцинация против гепатита А детям перед поступлением в детские дошкольные образовательные организации *(8) Вакцинация против менингококковой инфекции
Дети 6 лет	Ревакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита
	Третья ревакцинация против полиомиелита
Дети 6-7 лет	Вторая ревакцинация против дифтерии, столбняка, коклюша *(9)
	Ревакцинация против туберкулеза *(10)
Девочки 12-13 лет	Вакцинация против вируса папилломы человека*(11)
Дети 14 лет	Третья ревакцинация против дифтерии, столбняка
Взрослые от 18 лет	Ревакцинация против дифтерии, столбняка - каждые 10 лет от момента последней ревакцинации
Дети от 1 года до 18 лет, взрослые от 18 до 55 лет, не привитые ранее	Вакцинация против вирусного гепатита В *(13)
Дети от 1 года до 17 лет (включительно), женщины от 18 до 25 лет (включительно), не болевшие, не привитые, привитые однократно против краснухи, не имеющие сведений о прививках против краснухи	Вакцинация против краснухи, ревакцинация против краснухи
Дети от 1 года до 17 лет (включительно), взрослые в возрасте до 35 лет (включительно), взрослые от 36 до 55 лет (включительно), относящиеся к группам риска (работники медицинских и образовательных организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы, общественного питания; лица,	Вакцинация против кори, ревакцинация против кори *(14)

<p>работающие вахтовым методом, и сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори</p>	
<p>Дети с 6 месяцев, учащиеся 1-11 классов; обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования; взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы); беременные женщины; взрослые старше 60 лет; лица, подлежащие призыву на военную службу; лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечнососудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением; мигранты; строительные рабочие; работники торговли, общественного питания, лица, имеющие контакт с птицей.</p>	<p>Вакцинация против гриппа</p>

\* (1) Первая, вторая и третья вакцинации проводятся по схеме 0-1-6 (1 доза - в момент начала вакцинации, 2 доза - через месяц после 1 прививки, 3 доза - через 6 месяцев от начала вакцинации), за исключением детей, относящихся к группам риска, вакцинация против вирусного гепатита В которых проводится по схеме 0-1-2-12 (1 доза - в момент начала вакцинации, 2 доза - через месяц после 1 прививки, 2 доза - через 2 месяца от начала вакцинации, 3 доза - через 12 месяцев от начала вакцинации).

\* (2) Вакцинация проводится вакциной для профилактики туберкулеза для щадящей первичной вакцинации (БЦЖ-М); при показателях заболеваемости, превышающих 80 на 100 тыс. населения, а также при наличии в окружении новорожденного больных туберкулезом - вакциной для профилактики туберкулеза (БЦЖ).

\* (3) Вакцинация проводится детям, относящимся к группам риска (родившимся от матерей носителей HBsAg, больных вирусным гепатитом В или перенесших вирусный гепатит В в третьем триместре беременности, не имеющих результатов обследования на маркеры гепатита В, употребляющих наркотические средства или психотропные вещества, из семей, в которых есть носитель HBsAg или больной острым вирусным гепатитом В и хроническими вирусными гепатитами).



- \* (4) Первая и вторая вакцинации проводятся вакциной для профилактики полиомиелита (инактивированной).
- \* (5) Вакцинация проводится детям, относящимся к группам риска (с болезнями нервной системы, с иммунодефицитными состояниями или анатомическими дефектами, приводящими к резко повышенной опасности заболевания гемофильной инфекцией; с аномалиями развития кишечника; с онкологическими заболеваниями и/или длительно получающим иммуносупрессивную терапию; детям, рожденным от матерей с ВИЧ-инфекцией; детям с ВИЧ-инфекцией; недоношенным и маловесным детям; детям, находящимся в домах ребенка).
- \* (6) Третья вакцинация и последующие ревакцинации против полиомиелита проводятся детям вакциной для профилактики полиомиелита (живой); детям, относящимся к группам риска (с болезнями нервной системы, с иммунодефицитными состояниями или анатомическими дефектами, приводящими к резко повышенной опасности заболевания гемофильной инфекцией; с аномалиями развития кишечника; с онкологическими заболеваниями и/или длительно получающим иммуносупрессивную терапию; детям, рожденным от матерей с ВИЧ-инфекцией; детям с ВИЧ-инфекцией; недоношенным и маловесным детям; детям, находящимся в домах ребенка) - вакциной для профилактики полиомиелита (инактивированной).
- \* (6.1) Вакцинация и ревакцинация детям, относящимся к группам риска, может осуществляться иммунобиологическими лекарственными препаратами для иммунопрофилактики инфекционных болезней, содержащими комбинации вакцин, предназначенных для применения в соответствующие возрастные периоды.
- \* (7) Вакцинация против ветряной оспы проводится согласно инструкции по применению иммунобиологического лекарственного препарата с последующей ревакцинацией (минимальный интервал между прививками должен составлять не менее 6 недель).
- \* (8) Вакцинация против вирусного гепатита А проводится согласно инструкции по применению медицинского иммунобиологического препарата с последующей ревакцинацией (минимальный интервал между прививками должен составлять не менее 6 месяцев).
- \* (9) Вторая ревакцинация проводится комбинированной вакциной против коклюша, дифтерии, столбняка.
- \* (10) Ревакцинация проводится вакциной для профилактики туберкулеза (БЦЖ).
- \* (11) Вакцинация против вируса папилломы человека проводится согласно инструкции по применению иммунобиологического препарата по двухдозовой схеме 0-6 (1 доза - в момент начала вакцинации, 2 доза - через 6 месяцев после 1 прививки).
- \* (12) Третья и последующие ревакцинации проводятся анатоксинами с уменьшенным содержанием антигенов.
- \* (13) Вакцинация проводится детям и взрослым, ранее не привитым против вирусного гепатита В, по схеме 0-1-6 (1 доза - в момент начала вакцинации, 2 доза - через месяц после 1 прививки, 3 доза - через 6 месяцев от начала вакцинации).
- \* (14) Интервал между первой и второй прививками должен составлять не менее 3 месяцев.